

平成20年度
病害虫防除記録用紙

作物名	ほうれん草	圃場番号	面積	前作
品種	プライド	F-1-1	8a	チンゲン菜

生産者名

標準防除回数

春秋作4回

冬作2回

播種日	商品名	成分	施肥量	農薬項目	土壌処理	防除1	防除2	防除3	防除4	防除5	出荷予定日	確認	収穫始り	収穫終了	
1	9月4日	ス-ハ'-コ-ブ'フミン	8.8.8	120kg	農薬番号	1	14	14				10月6日	10月5日	10月7日	10月12日
					使用日	8月10日	9月20日	10月3日							
					使用量	1穴2ml	2000倍	2000倍							
2	9月9日	ス-ハ'-コ-ブ'フミン	8.8.8	120kg	農薬番号	1	14	14				10月13日	10月12日	10月14日	10月17日
					使用日	8月10日	9月20日	10月3日							
					使用量	1穴2ml	2000倍	2000倍							
3	9月13日	ス-ハ'-コ-ブ'フミン	8.8.8	120kg	農薬番号	1	14	14				10月17日	10月16日	10月17日	10月21日
					使用日	8月10日	9月20日	10月3日							
					使用量	1穴2ml	2000倍	2000倍							
4					農薬番号										
					使用日										
					使用量										
5					農薬番号										
					使用日										
					使用量										
6					農薬番号										
					使用日										
					使用量										

使用基準

No	病害虫	農薬名	10a当使用量	使用時期	使用回数
1	苗立枯病	ビクリン80	1穴当2~3ml		1
2	白サビ病	リドミル粒剤2	10kg	播種時	1
3	苗立枯病	リゾレックス粉剤	20~40kg	播種前迄	1
4	コナダニ類	ネマール粒剤30	30kg	播種前迄	1
5	ミナミキロアサミウ	ハダソンSG水溶剤	1500倍	7日前迄	2
6	タネハエ	ダイアジノン粒剤5	6kg	播種時	2
7	タネハエ	ダイアジノン粒剤10	3kg	播種時	1
8	タネハエ	カルホス微粒剤F	6kg	播種時	1
9	アブラムシ、ネギア	アドマイヤーフロアブル	4000倍	前日前迄	2
10	萎凋病、株腐 立枯病、根腐	ハスアミド微粒剤	20~30kg	播種10日前迄(20度以上) 播種21日前迄(20度)	1
11	ヨトウ、アブラムシ ミナミキロアサミウ	アグロスリン乳剤	1000~2000倍	7日前迄	5
12	ハスモンヨトウ	カスケード乳剤	4000倍	3日前迄	3
13	ハト病	アリエッティ水和剤	1500倍	前日前迄	2
14	ハスモンヨトウ	アファーム乳剤	2000倍	3日前迄	2
15	ハト病	ランマンフロアブル	2000倍	3日前迄	3
16	苗立枯病	ハシタック水和剤75	750~1500倍	土壌灌注(1㎡当り3L)	1
17	ハト病	ビスダイセン水和剤	500倍	本葉2葉期迄	2
18	アブラムシ類		1000倍		
	ヨトウムシ、ミナミキ	ランネット45DF	1000~2000倍	14日前迄	4